



Instrucciones Previas a la Prueba

Pediatric Comprehensive Assessment of Balance (PCAB)

El **Pediatric Comprehensive Assessment of Balance (PCAB)** evalúa el sistema del oído interno para identificar posibles causas de síntomas relacionados con el equilibrio. El proceso de prueba se completará en **3 horas**, con descansos frecuentes y momentos de recompensa/juego incorporados en la evaluación para niños más pequeños.

Es esencial seguir estas instrucciones previas al examen para un procedimiento de prueba exitoso.
¡Gracias!

Instrucciones previas al examen:

48 horas ante del examen, suspenda los siguientes medicamentos:

- Pastillas para la alergia (Allegra, Benadryl, Claritin, Zyrtec)
- Tranquilizantes o Relajantes nerviosos/musculares (Valium*, Librium, Xanax, Robaxin etc.)
- Diuréticos (Lasix, Diamox, otros: Abilify*, Aricept*, Namenda*, Plaquenil*)
- Descongestionantes/antihistamínicos (Benadryl, Sudafed, Dimetapp, Chlortrimeton, Seldane)
- Analgésicos (Acetaminofén, Aspirina, Codeína, Ibuprofeno, Darvocet, Hidrocodona, Metadona)
- Antidepresivos (Celexa, Pristiq, Zoloft)
- Medicamentos para el mareo (Antivert, Meclizina, Bonine, parches para el oído, Clonazepam, Compro Diazepam, Dramamine, Lorazepam, Metoclopramida, Prednisona, Prometazina, Transderm-Scop, Zofran; sedantes: Ambien*, Dalmane*, Diazepam*, Halcion*, Klonopin*)
- Narcóticos/barbitúricos (Codeína, Demerol, Percodan, Fenobarbital)

Nota: Consulte a su médico recetante antes de suspender los medicamentos tomados durante más de 3 meses.

El día del examen:

- Viste a tu hijo con ropa cómoda y zapatos planos y de apoyo. Los tenis son lo mejor.
- Los adolescentes mayores deben evitar todo maquillaje de ojos (delineador, máscara, sombra) para garantizar una grabación precisa del movimiento ocular.
- Evita alimentar a tu hijo con una comida abundante justo antes de la prueba. Una comida ligera es apropiada, y puedes llevar bocadillos y jugo claro a la cita para proporcionarlos durante los descansos.
- No consumas cafeína el día de la prueba, como café, té o cola. Sin cafeína están bien.
- No consumas bebidas alcohólicas ni medicamentos líquidos.

Después de la prueba:

- Tu audiólogo discutirá los resultados de la prueba contigo inmediatamente después de la evaluación.
- En un plazo de 48 horas, se publicará un informe formal en tu portal de pacientes y se enviará a tu médico.
- Puedes reanudar todos los medicamentos inmediatamente después de los procedimientos de prueba.

¡Recuerda seguir las instrucciones previas al examen proporcionadas y no dudes en hacer preguntas durante la evaluación!